



CURA del MONCONE OMBELICALE

Definizione

Il moncone del cordone ombelicale si stacca, essiccandosi, nel giro di 1 settimana, ma può passare anche un tempo di 3 settimane prima della sua caduta. A volte capita che nel punto di contatto con la cute si possa creare infezione oppure alla caduta del moncone si formi del tessuto di granulazione che impedisce la cicatrizzazione: in questi casi continua il gemizio di sangue, segnale che i genitori notano e riferiscono al medico.

DOMANDE

- **NOME** _____
- **ETÀ** _____ ● **SESSO** _____ ● **PESO** _____
- **Come si presenta l'area dell'ombelico?** _____
- **Da quanto tempo avete notato un problema all'ombelico?** _____
- **Il moncone tende a essiccarsi o rimane umido?** _____
- **C'è sanguinamento persistente dopo la caduta del moncone?** _____
- **Vedete rigonfiamenti della zona?** _____
- **Sono associati febbre o pianto del neonato?** _____

VISITA URGENTE SE:

- L'ombelico e/o la cute alla base del moncone presenta segni di infezione (arrossamento, edema, sanguinamento, striature rosse, stitico di sangue)
- Sanguinamento, più di qualche goccia
- Dolorabilità alla pressione e/o gonfiore
- Molta secrezione di pus e/o sangue
- Il neonato ha temperatura febbrile sopra i 38°C



VISITA DURANTE LE ORE DI STUDIO SE:

- Mucosa rossa e granulomatosa in corrispondenza della cicatrice ombelicale
- Sanguinamento persistente anche minimo dall'ombelico a 3 giorni o più dopo il distacco del moncone
- Ernia ombelicale o gonfiore di recente osservazione



TRATTAMENTO DOMICILIARE SE:

- C'è secrezione siero-ematica nei primi due giorni dal distacco del moncone
- C'è presenza di poche gocce di sangue dopo il distacco

ALTRE INFORMAZIONI/CONSIDERAZIONI

- Mantenete l'area ben pulita
- Lavate con acqua ossigenata
- Applicare alcol a 60°C o soluzioni a base di iodio o eosina
- Lasciate scoperta e all'aria la zona ombelicale

RICHIAMARE SE:

- Il moncone ombelicale non si è staccato dopo 3 settimane
- L'infezione si sta diffondendo
- L'area ombelicale non si secca dopo il trattamento con disinfettanti (Alcol, Eosina, Acqua ossigenata)
- L'area dell'ombelico continua a sanguinare 3 giorni dopo la caduta



a cura del Dott. Leo Venturelli, pediatra

Con il contributo
non condizionante di:



Con
il Patrocinio di:

